TITULO

MAPA HIDROGEOLÓGICO

MAPA / PLANO :

1/

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

PROYECTO:

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DEL ACUÍFERO SOMERO DEL PERÍMETRO URBANO DE BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL

MHC

LOCALIZACIÓN GENERAL
RESPECTO AL PERIMETRO DEL DISTRITO



DIBUJÓ: CARLOS CAPACHERO	FECHA: OCTUBRE / 2017	ESCALA: 1 : 25.000
REVISÓ: FEDERICO FRAGALA	FECHA: OCTUBRE / 2017	0 250 500 1,000 Metros
APROBÓ: JAIRO VELOZA	FECHA: OCTUBRE / 2017	

CONVENCIONES

GENERALES

Puntos de Agua SDA
- Aljibe
- Pozo
- Punto de Monitoreo

Hidrografía

Vías Principales

Secciones (G G')

Curvas de Nivel

Límite Modelo Hidrogeológico Conceptual

Perímetro Urbano

RASGOS ESTRUCTURALES

Estructuras de Fallamiento
- Falla de Cabalgamiento
- Falla Cubierta
- Falla Definida
- Falla Indefinida
- Falla Sinestral
- Lineamiento

Estructuras de Plegamiento
- Eje Anticlinal
- Eje Sinclinal
- Eje Sinclinal con Cierre

Rumbos y Buzamientos
- Invertido
- Normal
- Vertical

FLUJO
- Dirección de Flujo
- P: Precipitación
  R: Recarga
  EV: Evapotranspiración
- Dirección del Flujo Perpendicular al Perfil (Hacia Adentro)

PLANOS DE REFERENCIA

FUENTES:

Cartografía Base:

Malla vial: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

Perímetro urbano, drenajes, canales hidráulicas, cuerpos de agua: Secretaría Distrital de Planeación.

Puntos de medición: Levantamiento de campo PUJ

Límite Modelo Hidrogeológico Conceptual: SDA

Cartografía Temática:

Mapa hidrogeológico sector Tibitoc - Salto de Tequendama. Ingeominas - CAR.(1991)
Geología: Pérez y Salazar (1973), Ingeominas (1988), Helmens y Van der Jammen (1995), Ingeominas (2005), Terrae (trabajos compilados 2010), Buitrago (Este estudio - Contrato SDA 658-2010).

Hidrogeología: Ingeominas (2000), Modelo Hidrogeológico conceptual de la Sabana de Bogotá, (Ingeominas 2002).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sistema de Proyección de Coordenadas: MAGNA Ciudad Bogotá

Proyección: Transverse Mercator

Origen de Coordenadas: 74, 07750792
4, 59620042

Falso Origen: N 1000000
E 1000000

PERFIL G - G'

PERFIL H - H'



PERFIL I - I'



PERFIL J - J'



PERFIL M - M'



MAPA DE ISOPIEZAS SUBSUPERFICIALES



MAPA DE ISOPIEZAS ACUÍFERO PROFUNDO



LEYENDA HIDROGEOLÓGICA

A.		SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR		
		Formación Geológica	Características Hidrogeológicas	Propiedades
A3	Qdp	Depósitos de pendiente	Acuíferos de extensión local, discontinuos, libres a confinados. Conformados por limos a arenas con bloques, depósitos de ablación aluviales y sedimentos lacustrinos, todos de origen local. De moderada a alta importancia hidrogeológica.	Espesor max. (m): 30*
	Qrtsa	Río Tunjuelito	Acuífero de extensión local, libre a confinado. Conformado por secuencias de grava con intercalaciones de arenas arcillosas, arcillas, arcillas orgánicas y arcillas turbosas. los pozos pueden mostrar gradación, los cantos son redondeados con diámetros hasta de 40 cm. De moderada importancia hidrogeológica.	Espesor max. (m): 220
	T-ms	Rocas de metacaolización de arenizas del Grupo Guadalupe	Acuífero de extensión regional, confinado. Conformado por franco de arenizas desintegradas rellenadas por grandes concentraciones de arcillas caoliníticas limosas y arenosas, con intersos colores rojizos. De moderada importancia hidrogeológica.	Kh=k(t): 2-8*
	N2t	Tilatá	Acuífero de extensión regional, confinado a semiconfinado, conformado por cantos de arenizas a limolitas en matriz arcillo-limosa e intercalaciones de arenizas conglomeráticas y arcillolitas grises con presencia de lignito en su parte media, de la formación Tilatá. Conductividad hidráulica baja a media. De moderada importancia hidrogeológica.	T (m2/d): 5.35-870 K(m/d): 0.08 - 8.6 S: 0.0025 CE(Lam): 0.6 - 1.5 Qd.Aj: 0.1-41
	T-ma	Marichuela	Depósitos de flujo torrencial (grawes hasta bloques redondeados en matriz arcillosa) o depositos de flujo gravitacional (fragmentos de roca hasta bloques subangulares en matriz arenosa), alternando con sedimentos fluviales(los cuerpos ígneas, arenas compactas y arcillolitas(organicas), colores rojos, localmente con influencia de ceniza. expeser conocido 40m. De moderada importancia hidrogeológica	Espesor max. (m): 200
A4	Qsa2	Sabana	Acuífero multicapa de extensión regional, conformado por arcillas orgánicas, turbas, arcillas arenosas y arenas (arcillosas) intercaladas. De baja importancia hidrogeológica.	T (m2/d): 30-264* K(m/d): 1-4* Espesor max. (m): 320
	Qsu	Subachoque	Acuífero multicapa de extensión regional, conformado por arcillas arenosas, arcillas orgánicas y turbas alternando con arenas arcillosas a con arenas arcillosas y gravas.	T (m2/d): 7-160* K(m/d): 2-8* Espesor max. (m): 150
	Qsm	San Miguel	Acuífero de extensión local, confinado. Conformado por arcillas (micáceas)arenosas caoliníticas abigarradas y arenas arcillosas que a menudo contienen clastos subangulares-muy-redondeados, que alternan con arcillas orgánicas, arenas y gravas. De poca importancia hidrogeológica	Espesor max. (m): 15*
B.		ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS (ROCAS FRACTURADAS Y/O CARSTIFICADAS)		
		Formación Geológica	Características Hidrogeológicas	Propiedades
B3	Ksglt	Labor y Tierna	Acuífero de extensión regional, confinado, conformado por arenas,as blancas y pardo amarillentas, cuarzosas, friables con intercalaciones de capas delagadas de arcillolitas y limolitas. En los cerros occidentales y al sur de la ciudad presenta un afloramiento presentando un comprometimiento de acuífero libre este área. De moderada importancia hidrogeológica.	T (m2/d): 16-360 K(m/d): 1-8 S: 1.6E-3 - 2.5E-4 CE(Lam/c): 0.15 - 5 Qd.Aj: 6.5-33 Espesor max. (m): 600
	Kspd	Arenisca Dura	Acuífero de extensión regional, restringido a zonas fracturadas, confinado a semiconfinado, conformado por una sucesión rítmica de bancos gruesos de arenizas grises, tobas y arcillolitas. Hacia la parte superior se hallan lincillas silíceas de la Formación Arenisca Dura. De moderada importancia hidrogeológica.	T (m2/d): 22-356 K(m/d): 0.8 CE(Lam/c): 0.08 Qd.Aj: 0.5-4 Espesor max. (m): 420
B4	Tir	Regadera	Acuífero de extensión local, restringido a zonas fracturadas, confinado a semiconfinado, conformado por arenizas de tamaño medio a grueso y conglomerados con intercalaciones de arcillolitas. Conductividad hidráulica baja. De poca importancia hidrogeológica.	T (m2/d): 8-6 K(m/d): 0.02 CE(Lam/c): 0.005-0.07 Qd.Aj: 0.06-4 Espesor max. (m): 750
	Tic	Cacho	Acuífero pobre confinado a semiconfinado de extensión regional, conformado por arenizas de grano fino a grueso de color pardo a blanco grisaseo, friables, con estratificación cruzada hacia la base de la unidad. Presentan intercalaciones con capas delgadas a medias de arcillas abigarradas. Esta unidad arenosa se destaca por expresiones de relieve formando crestones. De poca importancia hidrogeológica.	T (m2/día)=(2E-6*** CE(Lam/c>0.08*** Espesor max. (m): 172
	T-kgs	Guadalupe conjunto superior	Acuífero pobre de extensión regional, discontinuo, confinado por secuencias de arcillolitas con intercalaciones de arenizas y mantos de carbón. Generalmente de poca importancia hidrogeológica	T (m2/d): 2.13-20.4 S: 1.14E-3 - 7.2E-3 CE(Lam/c): 0.008 Qd.Aj: 0.5-4 Espesor max. (m): 1100
	T-kgi	Guadalupe conjunto inferior		
	T-kgi	Guadalupe conjunto inferior		
	Kspp	Plaeners	Acuífero de extensión regional, restringido a zonas fracturadas, confinado a semiconfinado, conformados por una sucesión de arcillolitas, limolitas silíceas y tobas, con fracturamiento en las dos direcciones. Conductividad hidráulica baja. De poca importancia hidrogeológica.	T (m2/d): 8.6 ** K(m/d): 0.32** CE(Lam/c): 0.05-0.07 Qd.Aj: 0.06-4
C.		SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS RECURSOS DE AGUA SUBTERRÁNEA		
		Formación Geológica	Características Hidrogeológicas	Propiedades
C1	Qch1 Qch2 Qch3	Chía	Acuitardo de extensión local conformado por arcillas de inundación, arcillas orgánicas(ladrilleras (Qch1), limos fluviales (Qch2), conformar una cobertera delgada de limos fluviales sobre grawa de la formación Tunjuelo (Qch3). Sin importancia hidrogeológica.	Espesor máx (m): 10
	Qsa1	Sabana	Acuitardo de extensión local, conformado por arcillas lacustres. Sin importancia hidrogeológica	Espesor máx (m): 320
	T-u	Usme	Acuitardo de extensión local. Conformado por bolcitas grises claras, con esporádicas intercalaciones de arenizas de cuarzo y feldespato de grano fino. El miembro superior compuesto por arcillolitas limosas arenosmoladas con intercalaciones de arenizas de grano fino a medio. A tope de la formación aparecen capas de lignito y restos de materia orgánica. Sin importancia hidrogeológica	Espesor máx (m): 300
	T-b	Bogotá	Acuitardo de extensión regional. Conformado por arcillolitas abigarradas, predominantemente rojas, con intercalaciones de arenizas arcillosas friables de grano fino que gradan a limolitas y arcillolitas limosas. El espesor de la unidad es 1000 m. Sin importancia hidrogeológica.	Espesor máx (m): 1060
C2	Kach	Chipaque	Acuitardo de extensión regional. Conformado por arcillolitas arenosas y arcillolitas carbonosas con intercalaciones limolíticas y niveles de tobitas. Se presentan intercalaciones de arenizas cuarzosas de grano fino y muy fino glauconíticas y feldespáticas. De poca importancia hidrogeológica.	Espesor máx (m): 1027
ND	ND	No Definida	Formaciones con categorización no definida	NA

Parámetros hidráulicos obtenidos del mapa hidrogeológico sector Tibitoc - Salto de Tequendama. Ingeominas - CAR.(1991)
* Valores obtenidos de la base de datos de pozos PUJ-SDA (2017). ** Valores puntuales *** Valores obtenidos en Modelo Hidrogeológico conceptual de la Sabana de Bogotá. (Ingeominas. 2002).

PERFIL K - K'



PERFIL O - O'



PERFIL L - L'



PERFIL N - N'



PERFIL Ñ - Ñ'